n.° ~~99~~ 111.

troisieme observation sur un Bec-de-lievre naturel

La nature quoiqu'ordinairement Constante dans ses loix et dans ses opérations, s'en écarte cependant quelquefois, et elle vient de nous donner une preuve de ses bizarreries peu communes:

La nomme Cazanovette, marchande fruitiere de la ville de tonneins en agenois, accoucha le 14. juillet de cette année [1785] d'un gros garçon qui vint a terme. cet enfant bien constitué d'ailleurs est venu au monde avec un bec-de-lievre double et très compliqué a la levre Superieure; la division du coté droit n'est pas complette, elle n'a que trois a quatre lignes d'étendue et elle est située au dessous de l'aile droite du nez, celle du coté gauche est beaucoup plus considerable et elle ne fait avec la narine du même coté et la bouche, qu'une même ouverture; les bords de cette fente sont écartés l'un de l'autre de sept a huit lignes, de façon que la bouche ne peut jamais être fermée complettement dans cet endroit; la portion de la levre qui reste au milieu de ces deux divisions est adhérente au lobe du nez qui est très écrasé, et

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 53 n° 64 (a)

à la gencive qui recouvre l'arcade alvéolaire du côté droit; cette portion est terminée en pointe du côté du bord libre et represente assès bien le croupion d'une volaille, la forme du nez est très applatie et les joues sont fort élargies.

en examinent l'interieur de la bouche, l'on apperçoit que les apophyses pálatines des os maxillaires et des os du palais, sont écartées les unes des autres de dix à onze lignes en devant, et d'environ six en arriere, celles du côté gauche sont beaucoup plus éloignées du plant mitoyen que celles du côté opposé. le voile du palais est aussi partagé dans son milieu et dans toute son étendue, de maniere que la bouche proprement dit, l'arriere bouche et les fosses nazales ne font plus qu'une même cavité très diforme, dans le milieu de laquelle on voit le vomer et le cartilage triangulaire de la cloison du nez, et sur les côtés les bords internes des apophyses palatines tapissées par la membrane pituitaire. la fosse nazale droite ne paroit que quand l'enfant ouvre la bouche, parceque comme nous l'avons dit, la division de ce côté là ne se continue pas jusques à la narine ~~et~~ et que la ~~bouche~~ levre ferme un peu cette ouverture à l'exterieur. l'enfant tette un peu mais

avec peine et il ne peut saisir le bout du mammellon que du côté droit. j'ai recommendé de lui faire prendre le lait avec une cuillere.

je regarde cette difformité sans remède et hors des secours de l'art, car comment s'y prendre pour rapprocher ces pieces osseuses?

P.S. l'enfant est mort trois semaines après sa naissence. j'ai fait mon possible auprès des parents, pour obtenir la permission de faire ~~l'ob~~ l'ouverture du cadavre, mais ils n'ont jamais voulu me l'acorder.

je désire que ces premices soient dignes d'un regard de bienveillance de l'académie, et si je n'ai pas fait tout ce que je devais pour le meriter, j'ai fait du moins tous mes efforts.

Gase

maître en chirurgie,
a tonneins en agenois,
et ancien élève des hopitaux
de la ville de Cahors.

ARC 53 n° 64 (b)